

Příloha č. 3 – Návod k použití



Název přípravku: FLY BAIT MILK

Insekticidní nástraha proti mouchám

Granulovaná insekticidní nástraha proti dospělcům mouchy domácí a dalším druhům much, které jsou lákány vůní mléka. Přípravek obsahuje složku, která je výrazně hořká pro člověka a savce, což snižuje riziko jeho náhodného pozření. Použití profesionální.

Účinná látka: Imidacloprid 0,5g
(Z)-trikos-9-en 0,1 g
ve 100 g přípravku

Číslo oznámení :

Pozor

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
- S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
- S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
- S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Návod k použití:

Přípravek **FLY BAIT MILK** je velmi atraktivní a vysoce účinný proti dospělcům mouchy domácí a mnoha dalším druhům much, které láká vůně mléka. Přípravek lze použít ve všech vnitřních prostorech, kde se tyto druhy much vyskytují (kuchyně, potravinářské provozovny a výroby, objekty živočišné výroby apod.). Přípravek však není účinný proti mouchám a komárům, kteří sají krev. Tento přípravek je vhodné aplikovat ihned na začátku sezóny výskytu much, dříve než dojde k jejich přemnožení. Aplikaci přípravku opakujte po 30 dnech, nebo dříve, pokud je nástraha spotřebována nebo již není pro mouchy atraktivní.

Přípravek lze aplikovat dvojím způsobem:

1. Bez dalších úprav, v podobě, jaké byla dodána. Nástrahu položte ve vodorovné poloze na místě nejčastějšího výskytu much.
V tomto případě dávkujte 200 g granulí na 100 m² podlahové plochy. Mírné zvlhčení granulí zvyšuje účinnost.
2. Ve formě nátěru aplikujte přípravek následujícím způsobem: 200 g granulí smíchejte se 150 ml vody, dobře promíchejte a nechte asi 15 minut stát a znovu promíchejte. Pak nanášejte štětcem na nepórezní povrchy, na místa, kde se mouchy nejčastěji zdržují a kde odpočívají (zárubně dveří, trámy, ohradníky ve stájích, strop apod.)

Bezpečnostní opatření

Zbytky přípravku a jeho obaly musí být zneškodněny bezpečným způsobem
Při práci s přípravkem používejte pracovní oděv, pracovní rukavice a ochranné brýle. Před jídlem, pitím a kouřením a po skončení práce je nutné si umýt ruce vodou a mýdlem.
Přípravek aplikujte na místa, která nejsou dostupná dětem a domácím zvířatům. Při práci není dovoleno jíst, pít a kouřit. Vy varujte se jakémukoliv kontaktu přípravku s kůží a sliznicemi.
Používejte přípravek tak, aby nedošlo ke kontaminaci potravin, vody a krmiv.
Je-li nutná dekontaminace ošetřeného povrchu, použijte houbu navlhčenou v 5% roztoku chloridu sodného. Na textiliích může přípravek zanechávat viditelné skvrny.
Při hoření může přípravek uvolňovat oxid uhelnatý. Při hašení je třeba používat dýchací přístroj.

První pomoc:

Při náhodném požití: nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou a postiženého dopravte k lékařskému ošetření.

Při zasažení očí: Otevřené oko/oči vypláchněte proudem čisté vody a okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky: Zasažené místo omyjte vodou a mýdlem.

Lékař může případné otravy konzultovat s Toxikologickým střediskem, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 91 92 93.

Skladování:

Skladujte v originálních obalech v suchých, chladných, uzamčených skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků a chemických látek. Nevystavujte přímému slunečnímu svitu a teplotám vyšším než 40 °C.

Chraňte před mrazem.

Odstraňování obalů a zbytků přípravku:

Zbytky přípravku a jeho obaly likvidujte jako nebezpečný odpad.

Balení: 0,1; 0,5; 1; 2; 5 kg

Číslo šarže a datum výroby: viz obal.

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby.

Výrobce: Kollant S. p. A., Via C. Colombo 7/7A, 300 30 Vigonovo, Italy

Dovozce do ČR: Agrovita, spol. s r. o., Za Rybníkem 779, 252 42 Jesenice